




panpal

chem
protect



original
life saving
chemistry
www.chemprotect.eu



panpal

chem
protect



česky / protylaktické antidotum panpal

- Dlouhodobá ochrana před účinky nervově paralytických látek
- Prevence při selhání prostředků individuální ochrany (oblek, maska apod.)
- Jednoduchá aplikace (perorální tablety)
- Používán Armádami ČR a SR (státy NATO)
- Minimální nežádoucí účinky

Indikace:

Slouží k preventivnímu podání před předpokládanou expozicí nervově paralytickými látkami. Snižuje intenzitu příznaků intoxikace a zlepšuje celkové výsledky léčby otravy. Je určeno pro osoby při hrozícím nebezpečí zasažení nervově paralytickými látkami, zvláště somanem a pro osoby, které mají být vyslány do míst zamořených nervově paralytickými látkami ke zvýšení jejich ochrany v případě selhání použitých prostředků individuální ochrany. Nástup účinku je během 15-30 min, účinek trvá 8 h.

Popis:

Antidotum je dodáváno ve dvou kelímcích obsahujících přípravky:
PANPAL A (bílá válcovitá tableta s dělicí rýhou, účinné látky: Benaktyzini hydrochloridum, Trihexyphenidylu hydrochloridum).
PANPAL B –(potahovaná hnědá čočkovitá

tableta, účinná látka: Pyridostigmini bromidum).

Dávkování:

Tablety se dávkují společně, vždy jedna tableta PANPAL A a jedna tableta PANPAL B. Opakování dávky je možné nejdříve za 24 hodin.

Balení: po 30 tabletách.

Výrobce:

VAKOS XT Inc., Česká republika

Distributor:

Chemprotect a.s., Cukrovarnická 62,
162 00 Prague 6, Česká republika
tel.: +420 234 760 279-80
rtti@chemprotect.eu, www.chemprotect.eu

Upozornění:

Tato tiskovina má pouze informativní charakter a neslouží jako návod k použití.

Pro více informací: www.chemprotect.eu.



slovensky / protylaktické antidotum panpal

- Dlhodobá ochrana pred účinkami nervovo-paralytických látok
- Prevencia zlyhania prostriedkov individuálnej ochrany (oblek, maska, apod.)
- Jednoduchá aplikácia (perorálne tablety)
- Používajú Armády ČR a SR (krajiny NATO)
- Minimálne nežiaduce účinky

Idikácie:

Služí na preventívne podanie pred predpokladanou expozíciou nervovo-paralytickými látkami. Znižuje intenzitu príznakov intoxikácie a zlepšuje celkové výsledky liečby otravy. Je určené pre osoby, ktorým hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia nervovo-paralytickými látkami, predovšetkým somanom a pre osoby, ktoré majú byť vyslané na miesta zamožené nervovo-paralytickými látkami na zvýšenie ich ochrany v prípade zlyhania použitých prostriedkov individuálnej ochrany. Nástup účinku je v priebehu 15 – 30 min, účinok trvá 8 hodín.

Popis:

Antidotum sa dodáva v dvoch téglkoch obsahujúcich prípravky:
PANPAL A (biela valcovitá tableta s deliacou rýhou, účinné látky: Benaktyzini hydrochloridum, Trihexyphenidylu hydrochloridum)
PANPAL B (potahovaná hnědá šošovkovitá tableta, účinná látka: Pyridostigmini bromidum)

Dávkovanie:

Tablety sa dávkujú naraz, vždy jedna tableta PANPAL A a jedna tableta PANPAL B. Dávku možno opakovať najskôr po 24 hodinách.

Balenie: Po 30 tabletách.

Výrobca:

VAKOS XT a.s., Česká republika

Distribútor:

Chemprotect a.s., Cukrovarnická 62,
162 00 Praha 6, Česká republika,
tel.: +420 234 760 279-80
rtti@chemprotect.eu, www.chemprotect.eu